A 574740

H610.
A47
tB8

ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ

ДОМАШНІЙ И ДОРОЖНЫЙ

АЛЬМАНАХЪ

ДОКТОРА

АЛТШУЛЯ.

ПЕРЕВОДЪ СЪ НѢМЕЦКАГО

СЪ ПРИБАВЛЕНІЯМИ

В. Бремер.

МОСКВА.

Въ типографіи В. Грачева и Комп.

1866.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN





Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

H6 1.0.2
A 47 F
2 B 8

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Homoeopatičeskii
Domašnii i dorožnii
Almanach

Homœopathic
Domestic and Travelling
Almanac

by Dr. Altschul

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ

ДОМАШНІЙ И ДОРОЖНЫЙ

АЛЬМАНАХЪ

ДОКТОРА

АЛТШУЛЯ.

ПЕРЕВОДЪ СЪ НѢМЕЦКАГО

СЪ ПРИБАВЛЕНІЯМИ

В. БРЕМЕРА.

Издалъ А. Форвріхеръ.

МОСКВА.

—

1866.

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Дозволено цензурой, Москва, 10 іюля, 1865 года.

Въ Типографіи Грачева и К. у Пречистенскихъ воротъ, д. Милякова.

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСТАВЛЕНІЕ

для

УПОТРЕБЛЕНІЯ КАКЪ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХЪ, ТАКЪ И ДОМАШНИХЪ И НАРОДНЫХЪ СРЕДСТВЪ

при

начинающихся опасныхъ болѣзняхъ.

249500

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Гомеопатія, какъ домашняя медицина, сдѣлала значительные успѣхи въ Россіи; это доказывается большимъ количествомъ гомеопатическихъ лечебниковъ, появившихся на русскомъ языкѣ и назначенныхъ какъ для врачей, такъ и для неврачей. Многіе изъ нихъ отпечатаны уже вторымъ и третьимъ изданіемъ. Это обстоятельство должно бы, казалось, сдѣлать излишнимъ появленіе предлежащаго сочиненія, но издатель его желалъ дать приверженцамъ гомеопатіи краткій указатель, какъ предупреждать развитіе опасныхъ болѣзней во время путешествій, и надѣется, что эта книжечка выполнитъ пробѣлъ въ русской гомеопатической литературѣ.

Предлежащее сочиненіе вполнѣ соотвѣтствуетъ такому назначенію; оно содержитъ кромѣ того подробную діэтетику для здоровыхъ, и другую для боль-

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

ныхъ, таблицу главнѣйшихъ ядовъ, ихъ дѣйствій и противуядій, и нѣкоторыя другія полезныя статьи.

Мы же съ своей стороны сочли умѣстнымъ прибавить нѣсколько примѣчаній о приготовленіи лекарствъ и вмѣстѣ съ тѣмъ представить въ пространномъ реэстрѣ лекарствъ нѣкоторыя данныя объ отпускѣ медикаментовъ изъ гомеопатическихъ аптекъ. Сверхъ того мы присоединили къ этому таблицу объ антидотахъ и синонимахъ гомеопатическихъ лекарствъ, реэстръ извѣстныхъ намъ и гомеопатической центральной аптекѣ въ С. Петербургѣ гомеопатическихъ врачей и исключительно гомеопатическихъ аптекъ въ Россіи; заканчиваемъ же перечнемъ главнѣйшихъ сочиненій и журналовъ, появившихся на нѣмецкомъ, французскомъ и русскомъ языкахъ.

Переводчикъ.

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Abortus. Выкидышъ. Предупрежденіе его.

Признаки.

Такіе преждевременные роды, бывающіе часто въ первые мѣсяцы беременности, предвѣщаются слѣдующими явленіями: боли въ животѣ и крестцѣ, схожія съ потугами, истеченіе слизи и крови изъ маточнаго влагалища, позывы на испражненіе кала или мочеиспусканіе.

Леченіе.

Можно еще предупредить выкидышъ, тщательно соблюдая покойное, горизонтальное положеніе, избѣгая всѣхъ душевныхъ потрясеній и употребляя надлежащія лечебныя средства.

Мы даемъ **Arnica**, 6 дѣл., если причиной болѣзни было механическое потрясеніе, такъ паденіе, ударъ, ушибъ, или если она произошла отъ тяжелой носки или отъ поднманія тяжелыхъ предметовъ.

Aconitum, 6 дѣл., если болѣзнь произошла отъ испуга или гнѣва и появились лихорадочные припадки.

Ipecacuanha, 3—6 дѣл., если появились судороги, истекаетъ свѣтлокрасная кровь, ощущаются потуги, тошнота, рвота и обмороки.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Chamomilla, 6 дѣл., при судорожныхъ болѣхъ въ нижней части живота, когда выдѣляется цѣлыми сгустками темнокрасная, черная кровь, когда во время испражненій или мочеиспусканія ощущаются дрожь и холодъ.

China, 3—6 дѣл., гдѣ нѣтъ болей живота, но присутствуютъ сильная слабость, истекаетъ водянистая кровь и если въ то же время бываютъ головокруженіе, мутность зрѣнія, шумъ въ ушахъ и обмороки.

Crocus, 2—6 дѣл., когда кровотеченіе болѣе венозное и пассивное, кровь выходитъ черными, клейкими сгустками, въ животѣ ощущается какъ-бы прыганіе чего-то живаго; желтоватый цвѣтъ лица, печальное настроеніе духа и слабость.

Nux vom., 6 дѣл., при наклонности къ запорамъ, геморроидальныхъ страданіяхъ; когда кровотеченіе произошло вслѣдствіе злоупотребленія спиртныхъ напитковъ.

Nux vom., служитъ также хорошимъ средствомъ, предотвращающимъ выкидышъ.

Sabina, 3—6 дѣл., отличное средство, предотвращающее выкидышъ при уже появившемся маточномъ кровотеченіи, при родовыхъ боляхъ въ поясницѣ, истеченіи свѣтлокрасной крови и слабости.

Platina, 3—6 дѣл., хорошее предотвращающее средство особенно у нервныхъ женщинъ при возбужденномъ половомъ влеченіи, когда появленіе маточнаго кровотеченія сопровождается судорожными припадками.

Sepia, 6 дѣл., также средство, предотвраща-

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

щее выкидышъ, у женщинъ раздражительныхъ, наклонныхъ къ мигрени, головнымъ и зубнымъ болямъ.

Calcarea carbon., 6 дѣл., предохранительное средство, у полнокровныхъ женщинъ, тучныхъ, гдѣ мѣсячное очищеніе бываетъ слишкомъ сильно и появляется раньше срока, и когда на половыхъ частяхъ замѣтны расширенія венъ.

Домашнія и народныя средства.

Многія женщины, желая предохранить себя отъ выкидыша, носятъ небольшой, въ два вершка длиною, подковообразный магнитъ, обращенный полюсами вверхъ, въ повязкѣ на животѣ нѣсколько ниже пупка. Но должно также избѣгать выдергиванія зубовъ во время беременности. Во всякомъ случаѣ должно отъ времени до времени принимать всѣ эти предохраняющія и предупреждающія выкидышъ средства; особенно за нѣсколько недѣль передъ тѣмъ временемъ беременности, въ которое выкидышъ появился въ первый разъ.

Въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, гдѣ эти средства не помогаютъ, выкидышъ зависитъ отъ заноса, неправильнаго положенія послѣда; тогда необходимо, какъ можно скорѣе, обратиться къ совѣтамъ опытнаго акушера.

Apoplexia. Ударъ.

Онъ появляется въ различныхъ видахъ, такъ: кровавый ударъ, нервный ударъ, спинной ударъ, серозный или слизистый ударъ.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Кровавый или **мозговой ударъ** чаще бываетъ у мущинъ, нежели у женщинъ, появляется преимущественно на 40-70 году, у людей полнокровныхъ, съ короткой шеей, жирныхъ, одутловатыхъ; наклонны къ нему также пьяницы, одержимые болѣзнями сердца, страдающіе одышкой и пораженные зобомъ. Но все таки можно предотвратить его, давая по временамъ и въ очень маленькихъ пріемахъ **Aconitum, Belladonna,** и **Nux vom.**; вмѣстѣ съ тѣмъ должно избѣгать слишкомъ обильной раздражительной пищи и спиртныхъ напитковъ, не должно много сидѣть, носить узкую одежду или находиться въ слишкомъ теплыхъ комнатахъ, (температура комнатъ не должна быть выше 15° R.).

Если уже появляются предвѣстники, какъ-то: чувство тяжести въ головѣ, помутнѣніе зрѣнія, шумъ въ ушахъ, тугоухость, наклонность ко сну, тяжелые сны, краснота глазъ, холодъ конечностей, то должно тотчасъ позаботиться о скудной діэтѣ, давать въ питье много воды, употреблять растительную пищу, держаться покойно въ горизонтальномъ положеніи съ возвышенной головой, держать ноги въ теплѣ, а голову содержать прохладно, заботиться о достаточныхъ испражненіяхъ низомъ и употребить слѣдующія испытанныя на практикѣ лечебныя средства:

Aconitum, 6 дѣл., особенно у людей полнокровныхъ, когда болѣзнь была произведена испугомъ или гнѣвомъ, глаза красны, височныя артеріи сильно бьются, моча непроизвольно отдѣляется.

Arnica, 3—6 дѣл., одно изъ главнѣйшихъ средствъ, когда кровавый ударъ зависитъ отъ механическихъ

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

причинъ, такъ удара, толчка, паденія или давленія и если вмѣстѣ съ тѣмъ потеряно сознаніе, совершаются непроизвольно отдѣленія мочи и низомъ и уже начинаются параличныя явленія.

Baryta carbon, 3 раст.—6 дѣл., особенно умѣстно болѣе старымъ людямъ, преимущественно подагрикамъ и золотушнымъ; при параличѣ языка, параличѣ одной изъ нижнихъ конечностей, искривленіи рта, спячкѣ, хрипломъ дыханіи.

Belladonna, 3—6 дѣл., при сильномъ напорѣ крови къ головѣ, краснотѣ глазъ и лица, расширенныхъ зрачкахъ, парализованномъ языкѣ, потерѣ сознанія, затрудненномъ глотаніи.

Nux vomica, 6—15 дѣл., у пьяницъ при злоупотребленіи спиртныхъ напитковъ, кофе, параличѣ нижнихъ конечностей, запорѣ, тошнотѣ.

Opium особенно умѣстно у пьяницъ и болѣе старыхъ людей при потерѣ сознанія или бредѣ, соединенными съ конвульсіями конечностей, появленіемъ пѣны у рта, храпѣніемъ, горячею головою, краснымп глазами во время припадка; до него же головокруженіе, безсонница и пугающіе сны.

Phosphorus, 6 дѣл., часто оказывается отличнымъ средствомъ у старыхъ, разслабленныхъ людей, силы которыхъ сильно упали.

Tart. emet., 2 дѣл., гдѣ ударъ былъ произведенъ гастрическими причинами, переполненіемъ желудка и если онъ сопровождается потерею сознанія, хрипящимъ дыханіемъ и опасностію задушенія. Въ такомъ случаѣ можно также дать **Ipecacuanha**, 3 дѣл., особенно если есть отрыжка и тошнота.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

China, 3 дѣл., дается по Д-ру **Argenti** въ тѣхъ случаяхъ, когда до прибытія врача-гомеопата пустили кровь и осталась сильная слабость.

Нервный ударъ поражаетъ непосредственно нервную систему; здѣсь нѣтъ приливовъ крови къ головѣ, голова на ощупь холодна, лице блѣдно, холодно и впало, слезная жѣлезка блѣдна, тогда какъ въ кровавомъ ударѣ она красна, пульсъ малъ и слабъ, часто прерывается, общій видъ мертвеца.

Эта болѣзнь, зависящая отъ нервной слабости, предвѣщается слѣдующими признаками; губы трясутся, челюсть движется непроизвольно; непроизвольное жеваніе, затрудненное глотаніе, опаденіе верхняго вѣка, неподвижность языка, запканіе, онѣмѣніе конечностей.

Леченіе.

На ряду съ **Arnica**, **Baryta carbonica**, **Ipecacuanha** и **Phosphor.**, о которыхъ упомянуто при кровавомъ ударѣ, должно рекомендовать: **Crotalus**, 30 дѣл., при головной боли, удушьѣ, потерѣ языка и судорожномъ сжатіи рта, **Atropin.**, 6 дѣл., при вновь появившихся нервныхъ апоплексіяхъ, **Hyoscyamus**, 6. дѣл., при подергиваніяхъ, **Coffea**, 6 дѣл., при предшествовавшей безсонницѣ.

Серозный ударъ выражается блѣдностью и одутловатостію лица, сонливостію, чувствомъ пустоты въ головѣ, голова тепла, дыханіе затруднено, руки и ноги холодны, сонъ чрезвычайно глубокій, но больной, не смотря на это, легко можетъ быть пробужденъ.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Леченіе.

Такъ какъ серозный ударъ зависитъ отъ серознаго выпота въ мозгу, то должно употребить тѣ средства, которыя способствуютъ всасыванію, такъ: **Digitalis, Mercurius vivus, Ipecacuanha, Tart. emet. и Bryonia.**

Спинной ударъ бываетъ по большей части у людей старыхъ, страдающихъ геморроемъ и у женщинъ, которыхъ менструаціи прекращены. Больные ощущаютъ будто внизъ по спинѣ стекаетъ кипятокъ, движеніе позвоночника и нижнихъ конечностей затруднено, неправильныя испражненія мочи и кала, ноги холодны и безчувственны, къ головѣ нѣтъ приливовъ крови.

Употребляются преимущественно тѣ средства, которыя дѣйствуютъ на нервы спиннаго мозга, такъ:

Nux vomica, 6—15 дѣл., особенно когда нижнія конечности холодны и лишены чувствительности или когда не возстановляется геморроидальное теченіе.

Cocculus, 6 дѣл., если болѣзнь наступаетъ у дѣвицъ, не имѣвшихъ еще менструацій.

Pulsatilla, 6 дѣл., гдѣ подавлено мѣсячное очищеніе.

Само собой разумѣется, что всѣ эти средства могутъ быть употребляемы только до прибытія врача; если же онѣ не приносятъ никакой пользы, а опасность продолжается, то немедленно должно прибѣгнуть къ помощи врача.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Боли въ животѣ.

Признаки.

Если боль сопряжена съ дрожью, жаромъ, жаждой и болѣзненностью нижней части живота при дотрогиваніи, то она воспалительнаго свойства; если жажда незначительна, жаръ также и прикладываніе теплой руки не причиняетъ боли, напротивъ даже пріятно легкое давленіе, то боль имѣетъ нервный характеръ. Если она облегчается при отхожденіи вѣтровъ, то имѣемъ дѣло съ колпкою отъ вѣтровъ.

Леченіе.

Если боль имѣетъ воспалительный характеръ, то даемъ **Aconitum**, 6—15 дѣл., въ водѣ (на 6 ложекъ воды 9 капель) каждые $^1/_2$ часа по дессертн. ложкѣ; какъ скоро боль будетъ становиться легче, даемъ болѣе рѣдкіе пріемы.

Когда боль эта есть нервная, то даемъ такимъ же точно образомъ **Belladonna.**

Если она сопряжена съ вѣтрами, то даемъ **Chamomilla** или **Sulphur**, 6—15 дѣленія.

Боль головная

Признаки.

Головная боль появляется по большей части какъ симптомъ другихъ болѣзней; она бываетъ жгучая, сверлящая, давящая, колючая, дергающая или рвущая, занимаетъ или всю голову, или только часть ея, и различ-

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

на, смотря по тому, произошла-ли она отъ простуды, переполненія желудка, прилива крови къ головѣ, отъ механическихъ причинъ, такъ толчка или удара, отъ ревматическихъ или ломотныхъ пораженій, или отъ нервныхъ страданій (душевныхъ возмущеній, истерики). На этомъ основано и употребленіе лечебныхъ средствъ.

Леченіе.

Antimonium crudum, 6—30 дѣл., при переполненія желудка и особенно когда желудокъ испортился отъ употребленія кислой пищи.

Pulsatilla, 6—30 дѣл, особенно при порчѣ желудка жирной пищей, также при головной боли у дѣвицъ съ неправильной менструаціей, при головокруженіи безъ жажды.

Arnica, 6—30 дѣл., при головной боли, зависящей отъ наружныхъ причинъ; здѣсь можно употребить еще настойку **Arnica** снаружи (4 капли на нѣсколько ложекъ воды и этимъ слегка смачивать полотняныя тряпки).

Nux vomica, 6—30 дѣл., когда головная боль произошла отъ употребленія вина, баварскаго пива, крѣпкаго кофе или отъ умственныхъ занятій.

Chamomilla, 3—15 дѣл., когда головная боль произошла отъ сквознаго вѣтра послѣ внезапнаго пота, когда одна щека красна, а другая блѣдна и особенно при ночныхъ ревматическихъ головныхъ болях.

Calcarea carbonica, 6—30 дѣл., особенно умѣстно у золотушныхъ субъектовъ при ощущеніи холода въ головѣ и непроизвольномъ отдѣленіи мочи.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Bryonia, при ревматической боли, особенно одной стороны, ухудшающейся отъ движенія и облегчающейся при покоѣ.

China, 30 дѣл., когда головная боль появляется у дѣвицъ слабыхъ, малокровныхъ (анемичныхъ) хлоротичныхъ.

Apis, 30 дѣл., когда боль улучшается при сдавленіи головы руками и становится сильнѣе, если вставать со стула или кровати. Въ истерической головной боли вообще умѣстны: **Sepia, Ignatia, Cocculus, Aurum** и **Valeriana**; въ болях одной половины головы (мигрень): **Sepia, Moschus, Belladonna, Platina, Glonoin.** Головная боль, появляющаяся періодически, уступаетъ обыкновенно **China, Arsen., Ipecacuanha** и **Nux vomica.**

Домашнія и народныя средства.

Употребленіе холодной воды снаружи и внутрь; при хронической головной боли совѣтуютъ, ложась спать, каждый разъ тщательно разчесывать волосы; прибавлять тминъ въ пищу, особенно, если есть вѣтры и кислотность желудка; носить шапку изъ губки, особенно при ревматической головной боли.

Нерѣдко случается, что путешественники отдыхаютъ подъ орѣховымъ деревомъ, или даже спятъ тамъ, послѣ чего они отъ сильнаго его запаха, получаютъ головокруженіе и головную боль. Въ такомъ случаѣ должно тотчасъ выйти на свѣжый, чистый воздухъ и пить лимонную воду или малинный сиропъ съ уксусомъ и водой.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Боль зубная.

Признаки.

Зубная боль зависитъ по большей части отъ болѣзненнаго раздраженія зубнаго нерва, произведеннаго воспаленіемъ корня зуба, быстрой перемѣной холода и тепла, или костоѣдой.

Леченіе.

Оно сообразуется съ свойствомъ зубной боли—воспалительная-ли она, ревматическая и ломотная или нервная. На выборъ средства вліяютъ и побочныя обстоятельства, такъ время дня. Мы даемъ:

Aconitum, 6—30 дѣл., при зубной боли послѣ простуды, особенно если боль бьющая, при жарѣ во рту и приливѣ крови къ головѣ.

Belladonna, 6—30 дѣл., при нервной зубной боли у женщинъ и дѣтей, при зубной боли у беременныхъ, особенно гдѣ присоединяется воспаленіе горла.

Nux vom., 3—30 дѣл., въ зубной боли, происшедшей отъ умственныхъ напряженій, злоупотребленія кофе или спиртныхъ напитковъ, особенно если она появляется утромъ и сопряжена съ запоромъ.

Chamomilla, 6—30 дѣл., особенно у дѣтей, гдѣ боль по ночамъ всего сильнѣе, теплота въ кровати ухудшаетъ, лице на больной сторонѣ красно.

Mercur. solubil., 30 дѣл., при рвущихъ болякъ въ

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

корнѣ зуба, соединенныхъ съ чувствомъ разрыхленія въ зубахъ, опухолью десенъ, легкою кровоточивостію ихъ, истеченіемъ слюны изъ рта. Особенно умѣстно при зубной боли у дѣтей.

Opium, 6 дѣл., гдѣ производящая причина есть испугъ.

Arnica, если послѣ вырыванія зуба боль не прекращается и есть кровотеченіе. Arnica употребляется здѣсь какъ внутрь, 6 дѣл., такъ и снаружи (нѣсколько капель основной тинктуры держать съ водой во рту).

Acidum nitri, 6—30 дѣл., при зубной боли послѣ злоупотребленія ртутью, когда боли всегда хуже ночью въ постели.

Pulsatilla, 6—30 дѣл., при ревматическихъ и ломотныхъ зубныхъ болѣхъ, когда боль ослабляется отъ прохладнаго воздуха, а въ теплѣ ухудшается, распространяется сквозь ухо, перескакиваетъ съ одного мѣста на другое, сопряжена съ неправильностями менструацій.

Calcarea carbon., 30 дѣл., при ревматическихъ болѣхъ беременныхъ, если они усиливаются отъ холоднаго питья и сквознаго вѣтра.

Hepar sulph., 3 растир., при боли въ деснахъ, соединенной съ развитіемъ гноя.

Hyoscyamus, при одновременныхъ судорогахъ.

Rhus toxicod., 6—30 дѣл., при ревматическихъ ломотныхъ болѣхъ, когда онѣ отъ движенія ослабляются и въ покоѣ становятся сильнѣе. Въ противуположность ему дается **Bryonia,** когда боль при движеніи усиливается, а въ покоѣ дѣлается слабѣе.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Далѣе должно упомянуть о **Sepia**, 30 дѣл., средствѣ, даваемомъ въ зубной боли у беременныхъ и истериковъ. **Silicea** у субъектовъ золотушныхъ, зубы которыхъ поражены костоѣдой и когда боль сосредоточивается въ челюсти. **Staphysagria**, когда зубы внутри пусты и сдѣлались черны, при болѣзненныхъ наростахъ на деснахъ, особенно если боль появляется послѣ принятія пищи. **Sulphur**, когда подавлено геморроидальное теченіе.

Домашнія и народныя средства.

Кладутъ хлопчатую бумагу, пропитанную ромомъ въ ухо страждующей стороны; обливаютъ поваренную соль хлѣбной водкой, ставятъ эту смѣсь въ чашкѣ на горячіе уголья и поднимающіеся пары вбираютъ въ ротъ.

Въ заключеніе замѣтимъ, что людямъ нѣжнымъ, нервнымъ и истерическимъ, совершенно умѣстно нюхать тѣ средства, которыя приличны въ данномъ случаѣ. Выдергиваніе зубовъ должно совершаться осторожно; люди, страдающіе ревматизмомъ или ломотой, нерѣдко терпятъ отъ этого существенный вредъ, какъ я это вндѣлъ изъ моей 30-лѣтней практики.

Боль судорожная желудка, нервная боль желудка, Cardialgia, Castralgia.

Признаки.

Эта болѣзнь поражаетъ по большей части женскій полъ; больныя жалуются на стягивающее или свер-

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

лящее ощущеніе въ сторонѣ желудка, которое иногда распространяется до самой спины; если страданіе достигло болѣе сильной степени, то къ нему присоединяются колики, икота, рвота, сердцебіеніе, судороги и обмороки; сильное давленіе часто ослабляетъ боль.

Леченіе.

Какъ ни велико преимущество гомеопатическаго леченія нервной боли желудка передъ прежними методами леченія, но все таки необходимо обсудить то, что эта болѣзнь не всегда излечима; леченіе успѣшно, если нервная боль желудка имѣетъ чисто нервный характеръ или произошла отъ переполненія желудка или его катарра; если же болѣзнь зависитъ отъ различныхъ новообразованій въ желудкѣ или рака его, то излечимость ея очень сомнительна. Въ излечимыхъ случаяхъ мы пользуемся слѣдующими средствами:

Nux vomica, главное средство у людей, привыкшихъ къ кофе, спиртнымъ напиткамъ, чаю изъ ромашки, если болѣзнь выражается сильнымъ ощущеніемъ давленія въ сторонѣ желудка, болями въ крестцѣ, изжогой, кислой отрыжкой, тошнотою, запоромъ; и если ухудшеніе бываетъ преимущественно утромъ, а улучшеніе въ покоѣ.

Pulsatilla, 6—30 дѣл., если чувство давленія въ желудкѣ появляется послѣ употребленія жирной пищи и жирнаго печенья, при слизистыхъ испражненіяхъ, горькомъ вкусѣ; жажды нѣтъ, боль ухудшается при движеніи; у женщинъ имѣющихъ слабыя или исчезающія менструаціи.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Chamomilla, 3—12 дѣл., если нервная боль желудка произошла вслѣдствіе гнѣва, боль ухудшается ночью, улучшается отъ кофе; если же она отъ этого послѣднаго усиливается, то умѣстно *Nux vomica*.

Ignatia, 6—30 дѣл., особенно умѣстно у истерическихъ женщинъ, когда чувство пустоты въ желудкѣ мѣняется съ ощущеніемъ полноты въ немъ.

Carbo vegetab., при жгучей боли въ желудкѣ, изжогѣ, вѣтрахъ, потерѣ аппетита и твердыхъ испражненіяхъ.

Bryonia, 6—30 дѣл., при рвотѣ тотчасъ послѣ принятія воды и когда невозможно вынести малѣйшее давленіе. Умѣстно преимущественно субъектамъ, страдающимъ ревматизмомъ или ломотой.

Sepia, 6—30 дѣл., въ нервной боли желудка у беременныхъ и въ климактерическіе годы.

Sulphur, 6—30 дѣл., если боль сдѣлалась уже хроническою и вмѣстѣ съ нею есть геморроидальныя страданія.

Calcarea carbonica, 6—30 дѣл., также 3 раст., у людей наклонныхъ къ ожиренію, при отвращеніи къ мясной пищѣ, теплымъ кушаньямъ и постоянной отрыжкѣ воздухомъ.

Bismuthum nitricum и **Cocculus** должны также быть приняты во вниманіе при леченіи истерической нервной боли желудка.

Домашнія и народныя средства.

Обмывать сторону желудка утромъ и вечеромъ передъ сномъ холодной водой; употребленіе холод-

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

ной мясной пищи, что по моимъ наблюденіямъ чаще лучше переносится женщинами.

Впрочемъ люди, наклонные къ развитію кислотъ въ желудкѣ, тщательно должны избѣгать употребленія рѣпы, моркови, брюквы, петрушки, сельдерея, шпината и цвѣтной капусты.

Боль ушная. Otalgia.

Признаки.

Это чисто нервное страданіе ушей; боль бываетъ сверлящая, рвущая, жгучая или бьющая, происходитъ по большей части отъ простуды, что сопровождается насморкомъ, катарромъ, и опухолью миндалевидныхъ железъ; или вслѣдствіе прорѣзыванія зубовъ, при чемъ бываетъ боль въ челюсти и опуханіе щеки; или причиняется какимъ-нибудь насѣкомымъ, проникшимъ въ ухо.

Леченіе.

Chamomilla, 3—12 дѣл., когда боль особенно сильна ночью, и внутреннее ухо сухо.

Mercurius vivus, 3 раст. — 30 дѣл., когда внутреннее ухо влажно и рвущая боль распространяется до щекъ.

Pulsatilla, 6—30 дѣл., если боль имѣетъ ревматическій характеръ, произошла отъ сквознаго вѣтра и распространяется на всю половину лица.

Dulcamara, 3—24 дѣл., если боль произошла отъ простуды, если она въ покоѣ ухудшается и особенно сильна ночью.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Домашнія и народныя средства.

Припарки изъ толченой, вареной въ молокѣ ячменной крупы прикладываются къ больному уху, чѣмъ часто облегчается боль.

Воспаленіе горла, жаба.

Признаки.

При жабѣ обыкновенно воспаляются миндалевидныя железы, язычекъ, оболочки зѣва, глотка. Больные жалуются на сухость, колючую или жгучую боль въ горлѣ, глотаніе затруднено, миндалевидныя железы опухли, голосъ измѣненъ; если субъектъ одновременно страдаетъ катарромъ, то появляется колючая боль въ ухѣ и незначительная тугоухость; если онъ страдаетъ ревматизмомъ, то часто бываютъ затруднены движенія шеи.

Леченіе.

Aconitum, 6—30 дѣл. Этимъ средствомъ начинаютъ леченіе и часто достаточно его одного, если прибѣгаютъ къ нему при самомъ началѣ болѣзни.

Belladonna, 6—30 дѣл. При постоянномъ позывѣ къ глотанію и судорожномъ стягиваніи глотки при невозможности проглотить хоть что-нибудь и боли головы.

Mercur. solubil., Hahnem. 3 раст., если вмѣстѣ съ страданіемъ горла есть слюнотеченіе, боль въ подче-

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

люстныхъ железахъ, опухоль околоушныхъ железъ и рвущія боли въ конечностяхъ.

Nux vomica, 6—15 дѣл., особенно умѣстно, даже при вышеописанныхъ катарральныхъ явленіяхъ, когда ощущается колотье и не при глотаніи и когда при втягиваніи холоднаго воздуха, чувствуется шероховатость и изъязвленность.

Chamomilla, 3—12 дѣл. Одно изъ главныхъ средствъ при воспаленіи горла у дѣтей послѣ простуды, гдѣ по вечерамъ бываетъ лихорадка, при насморкѣ, хрипломъ голосѣ и кашлѣ.

Pulsatilla, 6—30 дѣл., когда миндалевидныя железы покрыты слизью и есть ревматическія боли въ ухѣ.

Apis, 6 дѣл., часто полезно въ жабѣ, если всѣ другія средства употребляются безъ успѣха.

Домашнія и народныя средства.

При сильномъ припуханіи миндалевидныхъ железъ, когда глотаніе трудно и болѣзненно, оно часто на время облегчается тѣмъ, что сильно сжимаютъ уши рукой. Улучшеніе совершается вслѣдствіе давленія на нервы. (На Nervus facialis и Ramus pharyngeus).

Чтобъ предупредить частый возвратъ жабы, надо постоянно содержать ноги теплыми, и ежедневно обмывать шею и окружность ея холодной водой. Но не надо обвязывать шею шарфами и соблюдая все это, никакъ не придемъ въ непріятное положеніе, что должны будемъ рѣшиться на вырѣзаніе миндалевидныхъ железъ, очень любимую теперь операцію.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Воспаленіе легкихъ. Pneumonia.

Признаки.

При этой всегда серьозной болѣзни, которая и въ счастливыхъ случаяхъ, когда нѣтъ смертельнаго исхода, часто оставляетъ за собой при малѣйшей ошибкѣ долговременныя послѣдствія, которую точно разпознать возможно только черезъ перкуссію и аускультацію, необходимо какъ можно скорѣе обратиться къ помощи опытнаго врача. Только, если нѣтъ врача и если болѣзнь лишь начинается, должно употребить нижеслѣдующія лечебныя средства, если всѣ симптомы заставляютъ предполагать присутствіе воспаленія легкихъ; признаки эти суть: сильный ознобъ, за которымъ слѣдуетъ сухой жаръ, стѣсненіе въ глубинѣ груди; короткое, скорое и боязливое дыханіе, красное лице, вдыханіе, которое производитъ колотье, затруднено, дыханіе болѣе совершается при посредствѣ брюшныхъ мышцъ, сухой кашель, впослѣдствіи отхаркивается мокрота ржаваго цвѣта, испражненій мало, жажда сильна, мочи мало, она красна и горяча.

Леченіе.

Aconitum, 6—30 дѣл., въ водѣ, (на 6 ложекъ воды 9 капель), каждые $^1/_2$ часа по ложкѣ, пока замѣтнымъ образомъ уменьшатся жажда и жаръ и появится потъ, послѣ чего даемъ по ложкѣ только каждые 2—3 часа.

Bryonia, 6—30 дѣл., когда при дыханіи показы-

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

ваются колючія боли въ груди; если вмѣстѣ съ тѣмъ являются ревматическіе, ломотные или желчные припадки. Хорошо поступаютъ, давая *Bryonia* послѣ *Aconit.*, если лихорадочное состояніе уже устранено и появился потъ.

Phosphor., 6—30 дѣл., когда показывается упадокъ силъ, потъ холодный и клейкій, испраженія отходятъ непроизвольно, пульсъ малъ и животъ вздутъ.

Tartarus emeticus, 3 раст., при продолжающейся сонливости, когда кашель сопровождается труднымъ отхаркиваніемъ и чувство сдавленія груди очень значительно.

Cannabis также достойно употребленія, если предшествовало тѣлесное напряженіе и есть сердцебіеніе, а также **Sulphur** у людей золотушныхъ и чахоточныхъ.

Эти средства, будучи употреблены вѣрно, часто могутъ еще до прибытія врача дать болѣзни безопасное теченіе и облегчить врачу лечебный трудъ.

Воспаленіе околоушной железы.

Parotitis.

Признаки.

Замѣчается опухоль, лежащая подъ ухомъ и идущая кпереди; она безболѣзненна, затрудняетъ жеваніе, глотаніе, раскрываніе рта, производитъ боль въ ухѣ и лихорадку, шея по большей части искривлена, подчелюстныя и миндалевидныя железы опухлы.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Опухоль наклонна исчезать и кидается на яички или яичники.

Леченіе.

Mercur. solub. Hahn., 3 раст., главное средство, если есть слюнотеченіе и затрудненное глотаніе.

Belladonna, 6—30 дѣл., гдѣ пораженъ и мозгъ, при головной боли, безсонницѣ, опасности задушенія во время глотанія.

Pulsatilla, 6—30. дѣл., гдѣ имѣло мѣсто перемѣщеніе болѣзни на яички или яичники.

Далѣе должно рекомендовать **Conium, Carbo veget., Hepar sulphuris**, когда опухоль грозитъ переходомъ въ затвердѣніе. Дѣйствіе этихъ средствъ можетъ быть подкрѣпляемо сухими и влажными припарками.

Воспаленіе уха. Otitis.

Признаки.

Путешественники, вслѣдствіе катарральныхъ и ревматическихъ пораженій, особенно вслѣдствіе сквознаго вѣтра, часто подвергаются многимъ ушнымъ страданіямъ, всего чаще воспаленію уха, причемъ поражается то наружная, то внутренняя часть уха. Если поражено наружное ухо, то мы наблюдаемъ: боль, жаръ, видимую красноту и припуханіе слуховыхъ проходовъ, что распространяется къ зубамъ и щекамъ и производитъ въ нѣкоторой степени тугоухость.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Если воспалено внутреннее ухо, то жгучая, рвущая, бьющая боль внутри уха сильна, она усиливается отъ движенія, мозгъ пораженъ, покой ночной нарушенъ, жеваніе и сморканіе болѣзненны.

Леченіе.

Pulsatilla, 6—30 дѣл., если воспаленіе уха произошло отъ простуды, боли въ ухѣ распространяются до половины лица и имѣютъ ревматическій, рвущій и' дергающій характеръ *).

Mercur. solub. Hahn., 3 раст., когда боль произошла отъ простуды, ушныя железы и наружная часть уха воспалены и опухлы.

Belladonna, 6—30 дѣл., при пораженіи мозга, бредѣ, бѣшенствѣ и обморокахъ.

Arnica, 6—30 дѣл., если страданіе часто возвращается и ухо чувствительно къ малѣйшему шуму, или когда слуховой проходъ былъ потрясенъ толчками, ударами или пушечнымъ громомъ.

Glycerin, отличное средство новѣйшей медицины, которое, будучи при воспаленіи наружнаго уха употреблено снаружи, часто удивительно быстро излечиваетъ боли и воспаленіе.

---

*) Pulsatilla вообще прекрасное средство при воспалительной ушной боли у дѣтей; въ ушной боли у женщинъ; въ ушной боли бывающей по ночамъ.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Выкидышъ. См. стр. 7

Геморроидальныя страданія.

Признаки.

Всего болѣе страданій производитъ такъ называемый скрытый геморрой, при которомъ нѣтъ кровотеченій, но за то бываютъ слѣдующіе припадки: болп въ крестцѣ, зудъ и жженіе въ заднемъ проходѣ и прямой кишкѣ, одеревенѣлость спины, боль въ плечахъ, болящіе узлы у задняго прохода. Вслѣдствіе прекращенія геморроидальнаго теченія часто развиваются кровотеченія легочныя, носомъ или показывается моча съ кровью; открытый геморрой причиняетъ мало страданій.

Леченіе.

Nux vom., 6 дѣл: когда геморроидальное страданіе было вызвано употребленіемъ спиртныхъ напитковъ, продолжительнымъ сидячимъ образомъ жизни и умственнымъ напряженіемъ; если есть запоръ, жгучая боль въ геморроидальныхъ шишкахъ, зудъ въ заднемъ проходѣ и если движенія сопровождаются чувствомъ разбитія въ крестцѣ.

Sulphur, 6—30 дѣл., если на ряду съ прежними явленіями показываются давящія боли въ затылкѣ, головокруженіе, сердцебіеніе, жилы бьются во всемъ тѣлѣ и въ животѣ бываютъ боли схожія съ коликами.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

На ряду съ этими двумя главными средствами, которыхъ часто однихъ достаточно, рекомендуются при скрытомъ геморроѣ еще **Capsicum** и **Ignatia**. При болящемъ открытомъ геморроѣ должно употребить **Belladonna**, **Sabina**, **Pulsatilla** и **Carbo vegetabilis**.

Домашнія и народныя средства.

Берутъ утромъ и вечеромъ по ложкѣ льнянаго масла; смѣшиваютъ **Tinct. Arnicae** съ 4 частями воды и это прикладываютъ къ болящимъ шишкамъ. Въ новѣйшее время совѣтовали покрывать геморроидальныя шишки коллодіемъ.

Головокруженіе. Vertigo.

Признаки.

Головокруженіе состоитъ въ кажущемся движеніи и колебаніи предметовъ, особенно пола подъ ногами.

Леченіе.

сообразуется съ производящимъ моментомъ:

Belladonna, 6 – 30 дѣл., при приливахъ крови къ головѣ, съ одурѣніемъ, круженіемъ и мерцаніемъ передъ глазами, шумомъ въ ушахъ и сердцебіеніемъ.

Acouitum, 6—30 дѣл. при приливѣ крови, который въ теплой комнатѣ ухудшается.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

China, 3—15 дѣл., когда головокруженіе зависитъ отъ малокровія (**Anaemia**). или отъ потери соковъ, особенно когда головокруженіе появляется періодически.

Cocculus, 6 дѣл., когда головокруженіе появляется послѣ качанія или ѣзды.

Nux vomica, 6—30. дѣл., при головокруженіи, бывающемъ преимущественно послѣ принятія пищи, что сопровождается вѣтрами, геморроидальными страданіями и запоромъ, а также когда головокруженіе происходитъ отъ умственныхъ напряженій или употребленія спиртныхъ напитковъ.

Pulsatilla, 6—30 дѣл., при головокруженіи хлоротичныхъ дѣвицъ, когда вмѣстѣ съ тѣмъ есть неправильность мѣсячныхъ.

Opium, 6—30 дѣл., при головокруженіи послѣ предшествовавшаго испуга, съ одурѣніемъ и сонливостью.

Phosphor., 6 дѣл., при нервномъ головокруженій послѣ поллюцій или онанизма.

Sulphur, 6—30 дѣл., при хроническомъ головокруженіи съ страданіемъ желудка, когда оно появляется преимущественно утромъ; **Petroleum**, 6 дѣл., здѣсь также хорошо дѣйствуетъ.

Могутъ быть употребляемы еще нѣкоторыя средства по опредѣленнымъ показаніямъ: такъ **Arnica**, 2—6. дѣл., когда головокруженіе зависитъ отъ потрясеній вслѣдствіе толчка или паденія; **Chamomilla**, 2—6 дѣл., когда гнѣвъ, **Coffea**, когда радость, **Cina**, 3—9 дѣл.—когда глисты произвели головокруже-

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

ніе. Противъ ломотнаго головокруженія заслуживаютъ употребленія **Pulsatilla** и **Rhus toxicodendron**; равно какъ **Cyclamen**, 15 дѣл., противъ головокруженія послѣ перемежающихся лихорадокъ, гдѣ появилось помутнѣніе зрѣнія.

Домашнія и народныя средства.

При головокруженіи, зависящемъ отъ приливовъ крови къ головѣ, особенно совѣтуется обмывать голову холодной водой.

Желудокъ испорченный. Indigestio.

Признаки.

Чувство давленія въ сторонѣ желудка, раздутіе живота, наклонность къ рвотѣ, отрыжка зловонными газами, отвращеніе къ пищѣ, клейкій вкусъ во рту, языкъ обложенъ бѣлымъ налетомъ, головная боль.

Леченіе.

Antimonium crudum, 6 дѣл., остается всегда главнымъ средствомъ при переполненіи желудка, отрыжкѣ, потерѣ аппетита и наклонности къ рвотѣ, но должно также употребить **Pulsatilla**, **Chamomilla**, **Nux vomica**, **Carbo veget.**, **Sulphur**, если оказываются тѣ признаки здѣсь, о которыхъ мы говорили при судорожной боли желудка.

China, 6—15 дѣл., умѣстно по показаніямъ нѣкоторыхъ практиковъ послѣ употребленія гнилой ры-

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN