

## Materiały do poznania rozmieszczenia geograficznego grzybów wyższych w Europie. I.

*Xeromocus parasiticus* (Bull. ex Fr.) Quéél. i *Pycnoporus  
cinnabarinus* (Jacq. ex Fr.) Karst. w Polsce

*Matériaux à la connaissance de la distribution géographique  
des champignons supérieurs en Europe. I.*

ALINA SKIRGIELLO


W wyniku prac przygotowawczych mających na celu skartowanie grzybów wyższych w Europie — zgromadziłam istniejące materiały dotyczące występowania w Polsce dwóch gatunków, a mianowicie *Xeromocus parasiticus* (Bull. ex Fr.) Quéél. oraz *Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq. ex Fr.) Karst. Obydwa gatunki zostały wyznaczone przez Komitet d/s Kartowania Grzybów Wyższych w Europie (CMME) jako „wzorcowe” dla wstępnego zgromadzenia danych i opracowania jednolitych metod pracy.

Zebrane tutaj materiały zawdzięczam prof. dr W. Zabłockiej, prof. dr J. Kochmanowi, doc. dr St. Domańskiemu, doc. dr H. Orłowski, dr H. Kreiselowi (Greifswald — NRD), dr B. Gumińskiej, dr T. Glaserowi, dr M. Lisiewskiej, mgr W. Wojewodzie oraz inż. T. Koreckiemu, którym serdecznie dziękuję za współpracę, jak również wszystkim, którzy umożliwili mi przejrzenie zielników.

Przyjęte skróty: Bi — województwo Białostockie, By — Bydgoskie, Gd — Gdańskie, Kie — Kieleckie, Ko — Koszalińskie, Kr — Krakowskie, Lub — Lubelskie, Po — Poznańskie, Rz — Rzeszowskie, Szcz — Szczecińskie, Wa — Warszawskie, Ziel — Zielonogórskie; AMG — Akademia Medyczna w Gdańsku, IBL — Instytut Badawczy Leśnictwa, PAN — Instytut Botaniczny Polskiej Akad. Nauk, SGGW — Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, UJ — Uniwersytet Jagielloński, UP — Uniwersytet im. A. Mickiewicza, UT — Uniwersytet im. M. Kopernika, UW — Uniwersytet Warszawski, WSRP — Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu, WSRP-Sie — Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu, Stacja Entomologiczno-Fitopatologiczna w Siemianicach.

*Xeromocus parasiticus* (Bull. ex Fr.) Quéél.

Grzyb występuje najczęściej grupami po kilka u podstawy owocników tęgoskóra, *Scleroderma aurantiacum* (L.) ex Pers. [= *S. vulgare*],



Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk *Pycnoporus cinnabarinus* (1) i *Xeroocomus parasiticus* (2) w Polsce

*Pycnoporus cinnabarinus* (1) et *Xeroocomus parasiticus* (2) en Pologne; distribution géographique

a rzadziej — *S. verrucosum* Pers. Pojawia się w lasach mieszanych, jasnych, wszędzie tam, gdzie występują tęgoskóry, w okresie lipca, sierpnia, a nawet września. Jest to grzyb w Polsce bardzo rzadki. W okresie ostatnich 70 lat spostrzeżono go tylko 8 razy. Wykaz jego stanowisk został oparty, zgodnie z wytycznymi Komitetu CMME, na wiarygodnych informacjach ustnych lub listownych, na danych zaczerpniętych z literatury oraz na materiale dowodowym.

Wykaz stanowisk: Gd — Przebrno k. Gdańska, wilgotny las mieszany VIII.57, leg. et det. J. Smarda i T. Sulma, AMG; Krynica Morska (Ludwig 1891); Z'eł — Wiązów k. Drezdenka (Ludwig 1891); Wa — Żyrardów VIII.57, fot. T. Korecki; Kr — Ciężkowice k. Szczakowej, hałdy w lesie sosnowym z *Vaccinium myrtillus* VIII.27 (Zabłocka 1931); Kie — Babule pod Sandomierzem

VII.24 (Siemaszko 1925); Rz — Dąbrówka k. Łańcuta, vid. H. Orłoś (in lit.); Lub — Bilgoraj, las sosnowy IX.39, vid. W. Zabłocka (in lit.).

*Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq. ex Fr.) Karst.

[= *Trametes cinnabarina* (Jacq. ex Fr.) Fr.]

Grzyb o pięknej, pomarańczowoczerwonej barwie owocnika, rozwijający się na martwym drewnie, najczęściej na gałęziach drzew liściastych, pojawia się u nas pojedynczo lub po kilka, lecz zawsze w rozproszeniu. W górach występuje na wysokości do 1500 m n.p.m. W Polsce najczęściej notowano go na *Fagus sylvatica* (10 ×), na *Betula* sp. i *B. verrucosa* (6 ×), na *Sorbus aucuparia* (2 ×) oraz na *Populus tremula* (1 ×), *Prunus* sp. (1 ×) i *Corylus avellana* (1 ×). Przyczyną rzadkiego występowania tego grzyba u nas jest prawdopodobnie racjonalna gospodarka leśna, usuwanie gałęzi, suszu, karczowanie pni itp. Stwierdzono w Polsce 25 stanowisk tego grzyba na obszarze prawie całego kraju, z wyjątkiem jego płn.-wsch. części. W przypadku bardziej intensywnych poszukiwań znajdziemy go, być może, również na Mazurach lub na Suwalszczyźnie, które stanowią białą plamę na mapie występowania.

Wykaz stanowisk: Szcz — Płasek k. Chojny VIII.51, det. H. Orłoś, IBL; rezerwat „Bukowe Źdroje” pod Szczecinem 5.IX.60, leg. et det. M. Lisiewska, UP; Ko — Warcino k. Miastka IX.49, leg. Z. Schnaider, det. H. Orłoś, IBL; Bory Tucholskie VII.49, leg. et det. W. Zabłocka, UT; Ziel — Żary k. Żagania VIII.48, leg. et det. A. Skirgiello, UW; Po — Bełęcin k. Wolsztyna 15.VI.50, leg. T. Glaser, det. K. Zaleski et T. Glaser, WSRP; B! — Białowieża, Park Narodowy i zagospodarowana część puszczy (Błoński 1888); 18.VIII i IX.22 oraz IX.25, leg. et det. W. Siemaszko, SGGW; VIII.22, leg. E. Malinowski, det. W. Siemaszko, SGGW; VIII.23, leg. et det. K. Zaleski, WSRP; Lub — Wojciechów k. Włodawy (K wieciński 1896); rezerwat „Jata” pod Łukowem (Zyskówna 1936); Kr — Kraków, Ogród Botaniczny 14.VII.61, leg. et det. W. Wojewoda, UJ; Tatry, Kominy Tylkowe, nad doliną Smytnią 13.VIII.17, leg. et det. A. Wróblewski, PAN; południowe zbocze Opalonego Wierchu, nad Morskim Okiem, na wysokości 1500 m n.p.m. VIII.60, leg. J. Endtmann, det. H. Kreisel, Greifswald (NRD); Rz — góra Kiczera k. Mszanny pod Duklą VII.25 (Felenczak 1927); Bieszczady, dolina potoku Lutowy 12.IX.58, na wysokości 800—900 m n.p.m. i grzbiet Działu k. Wetliny, 12.IX.58, Ustrzyki Górne 19.VIII.60, leg. et det. St. Domański, WSRP-Sie; szczyt Tarnicy k. Ustrzyk Górnych 16.VII.60, leg. et det. M. Lisiewska, UP; góra Jawornik 12.X.58 i grzbiet Działu k. Wetliny 5.IX.58, leg. et det. A. Skirgiello, UW; Hnatowe Berdo k. Wetliny 6.IX.58, leg. J. Siemaszkowa, det. A. Skirgiello, UW.

Po zestawieniu materiałów z całej Europy otrzymamy obraz występowania na tym kontynencie obydwu gatunków grzybów, będzie można określić granice ich występowania i zgromadzić dane mówiące o ich wymaganiach życiowych. Ale te sprawy będą wylaniać się stopniowo jako wynik szeroko zakrojonych prac.

## RÉSUMÉ

Grâce aux travaux préparatoires qui furent entrepris dans le but d'assortir les champignons supérieurs, on confronta les matériaux polonais concernant le *Xerocomus parasiticus* (Bull. ex Fr.) Quéél. et le *Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq. ex Fr.) Karst.

Cela permet de conclure que le *Xerocomus parasiticus* paraît en Pologne depuis le mois de juillet jusqu'au mois de septembre, et qu'il est assez rare. Par contre, bien plus souvent — mais en dispersion — on rencontre le *Pycnoporus cinnabarinus*. Dans la montagne il se trouve à 1.500 m. d'altitude. On le nota sur le bois mort des arbres feuillés comme *Fagus sylvatica*, *Betula* sp., *Sorbus aucuparia*.

## LITERATURA

- Błoński F., 1888, Spis roślin skrytokwiatowych zebranych w r. 1887 w Puszczy Białowieskiej, in: Błoński, Drymmer i Ejsmond „Sprawozdanie z wycieczki botanicznej, odbytej po Puszczy Białowieskiej”. Pam. Fizj. 8.III:59—155.
- Felenczak W., 1927, Grzyby podkarpackie okolic Dukli, Spr. Kom. Fizj. 61:167—187.
- Kwieciński F., 1896, Roślinność gminy Hańsk powiatu Włodawskiego, Pam. Fizj. 14.III:27—61.
- Ludwig F., 1891, Pilze, Ber. deutsch. Bot. Ges. 9:(186)—(199).
- Siemaszko W., 1925, Grzyby polskie nowe oraz rzadziej spotykane, Acta Soc. Bot. Pol., 2:269—274.
- Zabłocka W., 1931, Über *Boletus parasiticus* Bull. und *Pisolithus arenarius* Alb. et Schw. aus des Umgebung von Kraków, Bull. Ac. Sci. Lettres:177—180.
- Zyskówna Z., 1936, Przyczynek do flory mikologicznej rezerwatu jodłowego uroczyska Jata w Nadleśnictwie Państwowym Łuków, Rozpr. Spr. Inst. Bad. Leśn., s. A, nr 21:1—27.